

### <小児用肺炎球菌ワクチン>

接種開始	接種方法・接種間隔	注意点
(標準) 生後2ヵ月～ 7ヵ月未満	<p style="text-align: center;">24ヵ月未満で接種      12ヵ月以降 (標準的には12ヵ月まで) (標準的には12～15ヵ月)</p>	初回2回目、3回目の接種は生後24ヵ月までに行うこととし、それを越えた場合は行わない。初回2回目の接種が生後12ヵ月を越えた場合は3回目の接種は行わない。追加接種は実施可能。
生後7ヵ月～ 1歳未満	<p style="text-align: center;">24ヵ月未満で接種      12ヵ月以降 (標準的には12ヵ月まで)</p>	初回2回目の接種は生後24ヵ月までに行うこととし、それを越えた場合は行わない。追加接種は実施可能。
1歳～2歳未満		
2歳～5歳未満		

### <ヒブワクチン>

接種開始	接種方法・接種間隔	注意点
(標準) 生後2ヵ月～ 7ヵ月未満	<p style="text-align: center;">12ヵ月未満で接種</p>	初回2回目、3回目の接種は生後12ヵ月までに行うこととし、それを越えた場合は行わない。追加接種は初回接種後27日以上の間隔をあげて1回行う。
生後7ヵ月～ 1歳未満	<p style="text-align: center;">12ヵ月未満で接種</p>	
1歳～5歳未満		